GEBRAUCHSANWEISUNG

PROVOKE™

Professioneller Lockstoff für Mäuse und Ratten

PROVOKE™ ist ein innovativer, wirkstofffreier Lockstoff um Ratten und Mäuse im Rahmen des RPM erfolgreich zu bekämpfen

In den letzten 30 Jahren wurde das RPM (Rodent Pest Management) Programm von Bell Laboratories Inc. entwickelt, um Ihnen eine erfolgreiche Schädlingsbekämpfung zu ermöglichen.

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um eine erfolgreiche Nagerbekämpfung zu erzielen:

Sobald der Befall von Ratten & Mäusen ermittelt ist, werden einige Tropfen PROVOKE™ in die entsprechenden Nagerköderstationen, Lebendfallen, oder Schlagfallen eingebracht.

<u>Anwendung des PROVOKE™ Lockstoffs bei der Mäusebekämpfung</u>

PROVOKE™ Maus
kann in allen mechanischen Schlagfallen wie z.B. TRAPPER Snap Trap, TRAPPER Lebendfallen oder die Protecta Nagerstationen eingesetzt werden. Platzieren Sie den Lockstoff in den vorgesehene Schälchen bei der Trapper Snap Trap oder bei der Lebendfalle Trapper 24/7 auf dem Steg.

Bei der Schlagfalle wird der Lockstoff in die dafür vorgesehene Schale eingebracht.

Bei den TRAPPER Lebendfallen wird der Lockstoff in die Mitte des Einganges aufgebracht

Ein Tropfen PROVOKE™ (1 – 2 g) ist ausreichend um Mäuse anzulocken.
Die vorgeschriebene Dosis nicht überschreiten, stattdessen alle 2 – 3 m eine Falle mit Lockstoff platzieren.

Anwendung von PROVOKE™ bei der Rattenbekämpfung:

Die Schlagfalle TRAPPER T-Rex, die TRAPPER Glueboards und die Protecta Stationen sind geeignet für den PROVOKE™ Lockstoff.
Bei der Schlagfalle TRAPPER T-Rex muss der Lockstoff in die dafür vorgesehene Schale eingebracht werden.
Für die Glueboards reichen einige Tropfen in der Mitte aus: siehe Abbildung.



10 – 15 g PROVOKE™ Gel pro Rattenstation sind ausreichend.
Alle 5 – 7 m eine Falle platzieren.

Anwendung des Lockstoffs PROVOKE™ in Ratten- und Mäuseköderstationen:

PROVOKE™ sollte in den „Laufweg" der Station eingebracht werden.

Bei der Mäusebekämpfung sind 1 – 2 g in die Eingangslöcher oder vor dem Köder einzubringen:

Bei der Rattenbekämpfung sind 10 – 15 g in die Eingangslöcher oder vor dem Köder einzubringen:

Bitte beachten: PROVOKE™ darf auf keinen Fall direkt in bzw. auf den Köder platziert werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung