

Ein leistungsstarkes Mittel zur Vogelbekämpfung

Da *Bird Free* nur am tatsächlichen Lebensraum der Tauben und nicht am gesamten Gelände angewendet werden muss, ist es sowohl effektiver als auch kostengünstiger als Netze (die eher dazu dienen, einen Sperrbereich zu schaffen, als den Lebensraum selbst zu bekämpfen) und Spikes (die für Nester und Nachtquartiere ungeeignet sind).

Der tatsächliche Lebensraum der Tauben lässt sich im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilen:

- 1) Wo die Taube Schutz sucht (keine Nahrung vorhanden)
- 2) Wo die Taube Nahrung sehen kann.

Die befallenen Bereiche wurden als die Rahmen der oberen Fenster und die darunter liegende Fensterbank identifiziert. Es waren keine Lebensmittel vorhanden.



Tauben, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite nisteten, hatten begonnen, sich auf den geschützten Teilen der oben abgebildeten neuen Synagoge niederzulassen. Nach einer Inspektion stellte sich heraus, dass weder auf dem Dach, das zu exponiert war, noch an den unteren Fenstern Taubenaktivität zu beobachten war.



Die grünen Linien oben zeigen die Flächen, auf denen das Nisten beobachtet wurde. Sie stellen die Lebensräume dar, die von den Tauben als besonders schützend identifiziert wurden. Wir haben dem Kunden empfohlen, die mit grünen Linien markierten Bereiche mit *Bird Free* zu behandeln, da aufgrund der multisensorischen Wirkung des Gels der Lebensraum für die Tauben so unattraktiv würde, dass sie den Ort vollständig verlassen würden.



Der Kunde antwortete, dass er wollte, dass wir alle mit roten Linien markierten Bereiche behandeln (was fast das Dreifache des von uns angebotenen Preises gekostet hätte). Wir erklärten ihm, dass dies nicht notwendig sei, und um seine Bedenken auszuräumen, erklärten wir uns sogar bereit, alle anderen Bereiche, in die die Tauben umgezogen waren, kostenlos zu behandeln.



Im Dezember 2024 wurde *Bird Free* nur in den Bereichen installiert, die durch die grünen Linien auf Seite 3 oben gekennzeichnet sind. Bei der Inspektion des Geländes im Februar 2025 wurden zahlreiche Tauben beobachtet, die auf den Gebäuden auf der gegenüberliegenden Straßenseite nisteten und ruhten (wie im folgenden Video zu sehen: [Tauben verlassen den Ort](#)), jedoch wurden keine Tauben auf der Synagoge beobachtet. Der Kunde war mit dem Preis und natürlich auch mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

小島

BIRD FREE



Protecting the
urban environment

In diesem Lagerhaus gab es keine Lebensmittel, daher mussten nur die Nester und die Nachtquartiere behandelt werden.



Die Tauben nisteten auf den Kabeltrassen und in den Hohlräumen hinter den Rolltoren und übernachteten in den am besten geschützten Ecken. Eine Behandlung der Tagesquartiere war nicht erforderlich, da dort keine Nahrung vorhanden war.



Die auf Kabelkanälen gefundenen Nester wurden entfernt und desinfiziert. Der Nistplatz selbst wurde mit *Bird Free*-Schalen in Abständen von 15 cm behandelt; ein Meter auf jeder Seite des Nestes wurde mit Schalen in Abständen von 20 cm behandelt. (Alle Abstände sind von Mitte zu Mitte der Schale angegeben)



Die in den Hohlräumen hinter den Rolltoren gefundenen Nester wurden entfernt, desinfiziert und mit *Bird Free*-Schalen im Abstand von 15 cm behandelt. Die Landeflächen über den Toren wurden in Abständen von 25 cm mit Schalen behandelt, um eine Verschmutzung der darunter liegenden Schalen zu verhindern.



Alle Nachtquartiere wurden desinfiziert und mit *Bird Free*-Schalen in Abständen von 20 cm behandelt.

Ergebnisse

Im Lagerhaus gab es keine Nahrung. Die Tauben hatten sich dort niedergelassen, weil es ihnen Wärme und Schutz bot. Da sie Gewohnheitstiere sind, verließen alle dort lebenden Tauben das Lagerhaus, sobald *Bird Free* ihren Lebensraum unbewohnbar gemacht hatte.

Nur 70 Kartons (1.050 Schalen) *Bird Free* waren erforderlich, um die Taubenplage in einem 60 m x 80 m großen Lagerhaus zu beseitigen.

Sehen Sie sich das Video an: [Tauben verlassen Lagerhaus](#)



Orte, an denen Futter vorhanden ist

An Orten, an denen ständig Futter vorhanden ist, versammeln sich täglich große Mengen von Tauben. An solchen Orten müssen alle Bereiche behandelt werden, von denen aus die Tauben das Futter sehen können.

Siehe Video: [Bird Free™ schützt Dächer vor gefräßigen Tauben](#)